

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

قرص لوورازید یک داروی ضد پارکینسون است ، که برای بهبود علائم و نشانه های بیماری پارکینسون استفاده می شود . لوودوپا موجود در قرص لوورازید در بدن به دوپامین تبدیل و جایگزین این ماده از دست رفته در مغز شده و به این صورت به بیماران پارکینسون کمک می کند . بنسرازید هم از تبدیل لوودوپا به دوپامین خارج از مغز جلوگیری کرده و شدت عوارضی مانند تهوع را کاهش می دهد علاوه بر این میزان دسترسی مغز به لوودوپا را افزایش میدهد.

قبل از استفاده از لوورازید پزشک یا داروساز را از وجود هر یک از مشکلات زیر با خبر سازید:

- در موارد بسیار نادر لوورازید باعث به خواب رفتن ناگهانی می شود. لذا اگر فرد مصرف کننده تجربه خواب آلودگی بیش از حد و یا تجربه یک خواب ناگهانی را دارد از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند ، بپرهیزد و با پزشک خود تماس بگیرد.
- وجود هر گونه بیماری دیگر از جمله داشتن : تشنج ، دیابت ، زخم معده ، مشکلات ریوی ، کبدی ، کلیوی و یا اختلالات هورمونی ، افسردگی یا دیگر اختلالات روانی ، پوکی استخوان ، سابقه وجود لخته خون در رگ ها ، ریتم نامنظم قلبی و یا سابقه حمله قلبی ، بالا بودن فشار داخل چشم (گلوکوم) ، سرطان پوست و یا ضایعات پوستی مشکوک
- بارداری و یا قصد باردار شدن
- شیردهی
- حساسیت به هر یک از داروها ، مواد غذایی و رنگ ها یا مواد نگهدارنده
- انجام هر گونه جراحی که نیاز به بیهوشی عمومی دارد.

تداخلات دارویی

در طول مصرف لوورازید از مصرف هر گونه داروی نسخه ای یا بدون نسخه ،داروهای گیاهی و مکمل ها بدون مشورت با پزشک یا داروساز خودداری نمائید.

داروهایی که ممکن است با لوورازید تداخل داشته باشند ، عبارتند از :

- داروهای ضد سرفه و سرما خوردگی ، محتوی اپی نفرین یا ترکیبات مشابه آمفتامین ها
- داروهای پایین آورنده فشار خون
- دیگر داروهای ضد پارکینسون
- برخی از داروهای مورد استفاده در درمان مشکلات روانی
- قرص آهن یا قرص مولتی ویتامین حاوی آهن
- متوکلوپرامید
- هالوتان در صورتیکه عمل جراحی شما نیاز به داروی بیهوشی هالوتان دارد ، ۴۸-۱۲ ساعت قبل از آن مصرف لوورازید را متوقف کنید .
- ایزونیازید
- فنی توتین
- مقدار و نحوه مصرف

- مقدار مصرف دارو توسط پزشک و با توجه به شدت و نوع علائم و نشانه ها و میزان اثر دارو تعیین می شود.
 - مصرف به موقع و مطابق تجویز پزشک در اثر بخشی و کاهش عوارض ناخواسته از اهمیت زیادی برخوردار است.
 - دارو را به همراه یک لیوان کامل آب ببلعید و از جویدن قرص اجتناب کنید.
 - دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف نمایید.
 - در صورتیکه مصرف یک نوبت دارو را فراموش کردید به محض یادآوری باید آن را مصرف کنید مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی نزدیک باشد در اینصورت از مصرف دوباره دارو پرهیز کنید و تا زمان بعدی مصرف صبر کرده و دوز بعدی را به هیچ عنوان دو برابر نکنید.
 - در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده ، بلافاصله با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.
 - رژیم های غذایی غنی از پروتئین (به عنوان مثال : مصرف مقادیر زیاد گوشت ، ماهی و مرغ) ممکن است اثرات مفید لوورازید را کاهش دهد.
 - هیچگاه مصرف دارو را بطور ناگهانی متوقف نکنید.
- عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود. در بیشتر بیماران این عوارض جانبی جزئی و گذراست که عبارتند از :

- حرکات غیر عادی و غیر طبیعی مانند کشش و یا گرفتگی عضلانی
 - تهوع ، استفراغ یا اسهال به خصوص در زمان شروع مصرف که معمولا شدت آن با ادامه مصرف کاهش می یابد .
 - در این موارد بهتر است دارو با غذا مصرف شود . به هر حال در صورت شدید بودن علائم یا ادامه آن به پزشک مشورت کنید.
 - مشکلات روانی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون شایع است و ممکن است در طول درمان با لوورازید رخ دهد این علائم ممکن است شامل افسردگی ، گیجی ، اضطراب ، بیقراری ، توهم ، کابوس باشد. در صورت بروز هر یک از این علائم با پزشک مشورت نمایید .
 - تغییر در الگوی تپش قلب ، تغییر فشار خون ، غش ، خواب آلودگی ، عرق کردن ، لک های پوستی و خارش
 - مصرف دارو ممکن است باعث تیره شدن رنگ عرق یا ادرار شود.
 - در موارد بسیار نادر ممکن است تغییرات رفتاری مانند افزایش ریسک پذیری (تمایل غیرعادی به شرطی) و یا افزایش شدید در تمایلات جنسی بروز نماید. در این موارد با پزشک مشورت کنید.
 - در صورت بروز هر نشانه غیر عادی دیگر در زمان مصرف این دارو ، حتما پزشک و یا داروساز را مطلع نمایید.
- شرایط نگهداری

قرص لوورازید را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد ، دور از نور و رطوبت ، درون بسته بندی اصلی آن نگهداری نمایید .